

TARJETA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

DAB268.062016

Pradaxa[®]
Dabigatrán etexilato

- Tenga esta tarjeta consigo en todo momento
- Asegúrese de utilizar la última versión

Información sobre prevención de riesgos autorizada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

Enero 2016



Estimado paciente,

Su médico le ha recetado Pradaxa[®] (dabigatrán etexilato). Con el fin de utilizar Pradaxa[®] de forma eficaz y segura, por favor tenga en cuenta la información contenida en esta tarjeta.

Esta tarjeta contiene información importante sobre su tratamiento. Por favor, llévela siempre consigo e informe a los profesionales sanitarios de que está tomando Pradaxa[®].

1

Información de Pradaxa[®] para los pacientes

- Mientras esté en tratamiento con Pradaxa[®], siga las instrucciones de su médico.
- Pradaxa[®] hace que la sangre sea menos "viscosa", previene la formación de coágulos y reduce el riesgo de sufrir un ictus u otras complicaciones.
- Sin embargo, esto podría aumentar el riesgo de sangrado.
- En caso de un episodio de sangrado que no cese espontáneamente, informe inmediatamente a su médico.
- En caso de sangrado, póngase en contacto con su médico antes de dejar de tomar Pradaxa[®].

2

- Si durante el tratamiento se cae o lesiona, especialmente si se golpea la cabeza, solicite asistencia médica urgente. Puede necesitar que un médico le examine, ya que puede tener un mayor riesgo de sangrado.
- Los signos y síntomas de los episodios de sangrado pueden ser hematomas en la piel, heces negras, sangre en la orina, sangrado por la nariz, etc.
- Si se debe someter a cirugía o a otros procedimientos invasivos, informe al médico que le atienda de que está tomando Pradaxa[®] antes de la intervención.
- No deje de tomar Pradaxa[®] sin consultar a su médico.

3

- Tome Pradaxa® regularmente según lo indicado y no olvide ninguna dosis.
- Informe a su médico sobre todos los medicamentos que está tomando actualmente.
- Pradaxa® puede tomarse con o sin alimentos. La cápsula debe tragarse entera con un vaso de agua, para asegurar la liberación en el estómago. No rompa, mastique, ni abra la cápsula para tomar sólo su contenido, ya que ello puede aumentar el riesgo de hemorragia.

4

Información de Pradaxa® para los Profesionales Sanitarios

- Pradaxa® es un anticoagulante oral que actúa por inhibición directa de la trombina.
- En caso de cirugía o de otros procedimientos invasivos, Pradaxa® se debe suspender previamente (para más detalles, ver la Ficha Técnica).
- En caso de episodios de sangrado grave, se debe suspender Pradaxa inmediatamente.
- Puesto que Pradaxa® se elimina preferentemente por el riñón, se debe mantener una diuresis adecuada. Pradaxa® es dializable.

5

- Está disponible un agente de reversión específico (Praxbind®) (para más detalles y más recomendaciones para revertir el efecto anticoagulante de Pradaxa®, ver la Ficha Técnica de Pradaxa® y de Praxbind®).

Este material informativo sobre prevención de riesgos puede descargarse en la siguiente dirección web:
<https://www.anticoagulante.es/prevencionderiesgos>

Complete esta sección o pida a su médico que lo haga.

Información del Paciente

6

Nombre del paciente

Fecha de nacimiento

Indicación para la anticoagulación

Posología Pradaxa®

7