TARJETA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

Índice

Pradaxa®

dabigatrán etexilato

SC-ES-04274 05.20

- Tenga esta tarjeta consigo en todo momento
- Asegúrese de utilizar la última versión

Información sobre prevención de riesgos autorizada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

Mayo 2020

Boehringer Ingelheim

Estimado paciente:

Su médico le ha recetado Pradaxa®. Con el fin de utilizar Pradaxa® de forma eficaz y segura, por favor tenga en cuenta la información contenida en esta tarjeta.

Esta tarjeta contiene información importante sobre su tratamiento. Por favor, llévela siempre consigo e informe a los profesionales sanitarios de que está tomando Pradaxa®. 1

Pradaxa® dabigatran etexilato

Información de Pradaxa® para los pacientes

Sobre su tratamiento

- Pradaxa® hace que la sangre sea menos espesa, lo cual previene la formación de coágulos de sangre peligrosos.
- Mientras esté en tratamiento con Pradaxa®, siga las instrucciones de su médico. No se salte nunca una dosis ni deje de tomar Pradaxa® sin consultar a su médico. 2
- Informe a su médico sobre todos los medicamentos que está tomando actualmente.
- Informe a su médico de que está tomando Pradaxa® antes de cualquier intervención quirúrgica/procedimiento invasivo.
- Pradaxa® puede tomarse con o sin alimentos. Trague la cápsula entera con un vaso de agua. No rompa, mastique, ni abra la cápsula para tomar solo su contenido.

Cuándo solicitar asistencia médica

- Tomar Pradaxa® puede aumentar el riesgo de sangrado. Informe a su médico inmediatamente si presenta cualquiera de los siguientes signos o síntomas posibles de sangrado: hinchazón, molestias, dolor inusual o dolor de cabeza, mareo, palidez, debilidad, aparición inusual de cardenales, hemorragia nasal, sangrado de las encías, cortes que sangran inusualmente mucho tiempo, sangrado vaginal o 3

flujo menstrual anormal, sangre en la orina que puede ser rosa o marrón, heces de color rojo/negro, tos con sangre, vómitos con sangre o con material con aspecto de granos de café.

- Si se cae o lesiona, especialmente si se golpea la cabeza, solicite urgentemente asistencia médica.
- No deje de tomar Pradaxa® sin consultar a su médico, si experimenta ardor de estómago, náuseas, vómitos, molestias gástricas, hinchazón abdominal o dolor en la parte superior del abdomen.

4

Información de Pradaxa® para los profesionales sanitarios

- Pradaxa® es un anticoagulante oral (inhibidor directo de la trombina).
- Puede ser necesario suspender Pradaxa® antes de intervenciones quirúrgicas o procedimientos invasivos.
- En caso de episodios de sangrado grave, se debe suspender Pradaxa® inmediatamente.
- Está disponible un agente de reversión específico (Praxbind®) (ver la Ficha Técnica o Resumen de las Características del Producto de Pradaxa® y de Praxbind®)
- Pradaxa® se elimina principalmente por el riñón; se debe mantener una diuresis adecuada. Pradaxa® es dializable.

5

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en el prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: https://www.notificaRAM.es

6

Complete esta sección o pida a su médico que lo haga.

Información del paciente

Nombre del paciente

Fecha de nacimiento

7

Indicación para la anticoagulación

Dosis de Pradaxa®